

Si-EnD

Ibuprofeno 400 mg

Formula cualicuantitativa: Cada comprimido contiene:

Ibuprofeno 400 mg, Croscarmelosa Sódica; Dióxido de Silicio Coloidal; Lauril Sulfato de Sodio; Lactosa; Celulosa Microcristalina.

Acción Terapéutica: Analgésico-Antifebril-Antiinflamatorio.

Uso del Medicamento. Lea detenidamente esta información.

Esta indicado para el alivio sintomático de dolores (de espalda, de cabeza, menstruales, musculares, dientes), dolores producidos por artritis, dolores asociados a estados gripales y para reducir la fiebre.

Como usar este medicamento:

Adultos y mayores de 15 años: 1 comprimido cada 6 u 8 horas mientras los síntomas persistan.

Dosis máxima: 1200 mg/día (3 comprimidos de 400 mg). Tomar el medicamento preferentemente después de las comidas. Mayores de 65 años: consulte a su médico.

Niños menores de 15 años: consulte a su médico.

Contraindicaciones: Alergia al Ibuprofeno, aspirinas u otros analgésicos antiinflamatorios. Insuficiencia hepática y renal. Advertencias y precauciones: No usar este medicamento por más de 5 días para el dolor o más de 3 días para la fiebre.

Si los síntomas continúan o si el área dolorida esta roja o hinchada, deberá consultar al médico. Si usted consume 3 (tres) o más vasos diarios de bebida alcohólica consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Aunque el Ibuprofeno tiene las mismas indicaciones que la aspirina y el paracetamol, no deben administrarse juntos excepto bajo supervisión médica. La ingesta del Ibuprofeno puede alterar ciertas pruebas de laboratorio, análisis de sangre fundamentalmente.

Consulte a su médico antes de tomar Ibuprofeno si sufre de úlcera gástrica o duodenal, enfermedades del hígado o riñón, hipertensión arterial y/o insuficiencia cardíaca.

Si usted está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

Si usted padece alguna enfermedad cardíaca o presenta factores de riesgo cardiovasculares como por ejemplo Hipertensión arterial, Diabetes, Hiperlipidemia (colesterol y triglicéridos elevados), obesidad, tabaquismo, etc. Deberá ingerir la dosis indicada por no más de 5 días para el dolor o 3 días para la fiebre.

Reacciones Adversas: Este medicamento puede producir náuseas, acidez, trombocitopenia (disminución en el número de plaquetas), reacciones de hipersensibilidad (erupción, picazón, urticaria), dolor estomacal, trastornos en el tránsito intestinal, mareos y cefaleas.

Interacciones con otros medicamentos: Si usted ingiere regularmente otro medicamento consulte a su médico antes de consumir este producto a fin de evaluar posibles interacciones entre los mismos.

Sobredosis: Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de Toxicología: Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez - Tel. (011) 4962-6666/2247. Hospital Dr. Alejandro Posadas - Tel. (011) 4654-6648 / 4658-7777. Centro de asistencia Toxicológica La Plata Tel. (0221) 451-5555.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N°: 48.428

HLBPharma GROUP S.A. Av. Tomkinson 2054 (B1642EMU) San Isidro. Buenos Aires. Tel.: (011) 4835-4400
www.hlbpharma.com.ar.

Director Técnico: Roberto A. Carluccio, Farmacéutico. Última revisión: Agosto de 2021

Este medicamento, como cualquier otro, debe permanecer alejado del alcance de los niños. Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico.