

¿Tenés dudas?

**HACÉ UNA CONSULTA
ONLINE GRATIS
CON UN MÉDICO**

 HACER VIDEOLLAMADA

Recibi atención médica calificada e inmediata por videollamada



AUSPICIADO POR



ISOXSUPRINA HLB **Isoxsuprina 10 – 20 mg** **Comprimidos**

Venta Bajo Receta

Industria Argentina

Fórmula:

Cada comprimido de 10 mg contiene:

Isoxsuprina Clorhidrato10,00 mg

Excipientes:

Lactosa. Almidón de maíz. Talco. Estearato de Magnesio.

Cada comprimido de 200 mg contiene:

Isoxsuprina Clorhidrato20,00 mg

Excipientes:

Lactosa. Almidón de maíz. Talco. Estearato de Magnesio.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Inhibidor de la contracción del rniometrio. Dilatador de las arterias periféricas y cerebrales.

INDICACIONES

Amenaza de aborto. Parto pretérmino. Tetania uterina.

POSOLOGÍA

10 mg a 20 mg, 3 a 4 veces por día. Se recomienda su ingestión después de las comidas.

Acciones colaterales v secundarias:

La sensibilidad a la isoxsuprina es individual. Algunos pacientes pueden manifestar mareos, palpitaciones, taquicardia, sensación de asfixia, hipotensión arterial, sintomatología que suele desaparecer con la disminución de la dosis.

Por vía oral, pueden ocurrir epigastralgias, náuseas y, raramente, vómitos, que también ceden con la reducción de la dosis diaria.

También puede presentarse rush cutáneo como acción colateral.

Cuando se usa por vía endovenosa puede presentarse taquicardia fetal y raramente edema pulmonar materno de gravedad variable.

Antagonismos, antidotismos e interacciones:

La isoxsuprina es incompatible farmacológicamente con drogas beta bloqueantes.

CONTRAINDICACIONES

Angina de pecho grave, insuficiencia cardíaca congestiva, hipotensión, arritmia, luego de una hemorragia arterial reciente, taquicardia, desprendimiento de placenta normoinserta, post-parto inmediato, corioamnionitis, hipertiroidismo, eclampsia o preeclampsia severa, hipertensión pulmonar.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Uso cuidadoso en hipertiroidismo y diabetes. En pacientes geriátricos aumenta el riesgo de hipotermia inducida por isoxsuprina, que puede modificar las concentraciones sanguíneas de glucosa y las séricas de ácidos grasos, potasio e insulina.

Se evaluará la relación riesgo-beneficio cuidadosamente en casos de pacientes que presenten: glaucoma, asma, preeclampsia leve o moderada.

Durante la administración en forma endovenosa el paciente debe ser mantenido en posición decúbito lateral y debe controlarse la presión y la frecuencia cardíaca.

No debe ser administrada parenteralmente a pacientes con enfermedades cardíacas.

PRESENTACIONES

Envases conteniendo 10, 20, 30, 40, 250, 500 y 1000 comprimidos, siendo las tres últimas presentaciones para Uso Hospitalario Exclusivo.

Mantenga fuera del alcance de los niños

Mantener en lugar fresco y seco

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N°: 45.579

HLB PHARMA GROPU S.A.

Av.Int. Tomkinson 2054 – (B1642EMU) – San Isidro.

Pcia. De Buenos Aires – Tel: (011) 4732-8300

Director Técnico: Roberto A. Carluccio, Farmacéutico

Fecha de revisión: Enero 2021

